ガ其月ニ覽ラレル様ニナラウト信ジテ居リマス、何分夏秋ノ候トナリマスト斯學慾ニ驅ラレ毎年私ノ旅行ガ多クナリマスノデ、ツイ從來ノヤウナ澁滯ヲ來シ勝チデ此點ハ何トモはや相濟マザル事ト頭ヲ掻イテ居リマス幸ニモ私ノ健康ハ從來ト同ジク少シモ衰ヘマセンノデ充分筆硯ニ從事スル事ガ出來ルノデ此點ハ幸ニ御休神ヲ願ヒタイト存ジマス、以前「目もよい齒もよい足腰達者うんと働らこ此御代に」ト謠ヒマシタヤウニ私ノ意氣込ミハ依然トシテ其通リデアリマス、ソシテ今年ノ元日ニハ次ノヤウニ謠ッテ見マシタ

白井太郎博士（昭和二年四月五日撮影）

午の年馬にも優る突進を心に誓ふ元日の朝



白井博士のはがき

馬のごと火焔立つべき勢を吾れも見せんと勇む元日

我が齡六十九とはなりつれどなど勝たざらん馬の奔するに

（各方へ呈セシ年始ノはがき ノ負けざらんヲ右ノ如ク勝たざらんト訂正スル）

次ニ四方ノ諸賢ニ御願ヒシタイノハ、ドウゾ此雜誌ノ購讀ヲ御知人間ヘ御奬メ下サレン事デス（まづいモノヲ御スヽメシテ濟ミマセンガ）從來一向ニ廣告ヲシマセンノデ世間ノ人々ガ此ンナ雜誌ノアル事ヲ餘リ知ラヌヤウデス、其レ故發行部數ガ少ナク其少ナイ點ニ就テハ此雜誌ガ恐ラク日本一デハナイカト思ハレマス、ソレデモ日本一ト謠ハルレバ名譽デ自ラ慰メテモヨイヤウナモノデアリマスケレド常ニ出資シ下サル津村家ヘ對シ其レハ私ノ立場カラ實ニ實ニ痛心ノたねデス、購讀者ガ多ケレバ此苦ミカラ私ガ免ガレル譯デスカラ此ニ諸賢ノ御同情ニすがって早ク此惱ミカラ脫シ去リ津村家ニモ喜ンデ戴キタイト思念シテ居リマス

目下右ノヤウナ窮況ニ居リマス譯デスカラ此レ迄毎號百圓餘モ損失ヲシテ御寄贈申上ゲテ居リマスノヲ失費ノ點カラ萬々止ムヲ得ズ差シ扣ヘルカモ知レマセンカラ此點ハ惡カラズ偏ニ御賢察ヲ願ヒ上ゲ置キマス

○蕾軒獨語（其三十三）

蕾軒　朝比奈泰彦

けくづごけ
(Leptogidium byssoides var. japonicum A. Zahlbr.)
（弱擴大）（原圖）





けくづごけ
(Leptogidium byssoides var. japonicum A. Zahlbr.)
枝幹ノ横斷ト側面（皮層ノ大部分ヲ除キ綠顆粒ヲ示ス）
（擴大）（原圖）

○けくづごけ（毛屑苔）

トハけごけ科 Ephebeaceae ノ一地衣 Leptogidium byssoides (Carr.) A. Zahlbr. var. japonicum A. Zahlbr. ニ附ケタ和名デ此學名ガマダ定マラナカッタ時故安田理學士ガ予ノ採集品ニ命名シタモノデアル、駿州富士ノ裾野、相州箱根、豆州天城等ノ杉皮ニヨク着生スルモノデ一見汚藍色ノ小ナル毛布片ノ如キ群落ヲ構成シテ居ル、地衣體ハ圓筒狀デ基部ノ太サ〇・一二「ミリ」先端ノ太サ〇・〇二—〇・〇三五「ミリ」位アリ反覆叉狀ニ分岐シ全長僅ニ一—三「ミリ」許、外面ニハ一層ノ擬柔組織樣上皮アリ綠顆體（ゴニデア）ハ珠數形ニ連レル單列藻（シトネマ）デ明ナル異形細胞 Heterocyst ヲ挾ミ數箇ノ藻列ハユルク並ンデ稍〻斜ニ皮層ノ內面ヲ走リ、髓心ニハ體軸ニ平行セル菌絲束ガアル、子器ハ基

部ニ近キ枝ノ先端ニ圓盤狀ノ楯形ヲナシテ附着シ枝叢中ヨリ僅ニ面ヲ現ハス、盤ハ暗赤褐色、殼ハ淡黃色柔組織樣ヲナシ綠顆粒ヲ含マズ、絲狀體ハ單條、子囊ハ棍棒狀八子ヲ容レ、胞子ハ無色長橢圓形單胞デ大サ 10—15×5—7 μ ヲ有スル

Nylander ノ Lichenes Japoniae, p. 14. ヲ見ルト Leptogidium Moorei (Hepp) Nyl. ヲ揭ゲテアリ其說明ニハ無子器トアル、安田氏植物學各論隱花部第六一九頁ニ L. Moorei ニみやまけごけナル和名ガ附テ居ル、コレハ Ephebe lanata (L.) Wainio. ヲけごけト呼ンダノニ對比シタモノデアルガ寧ロ Leptogidium ノ方ガ人里近クニ產シテ居ルノデ面白クナイ、ソコデ後ニ至リ同氏ノ命名シタけくづごけヲ採用スルコトヽシタ、偖エングラー・プラントル植物分科大全第一版 I. 1* 地衣部 p. 155-156 ニ Zahlbruckner ハ Leptodendriscum Wainio. ト Leptogidium Nyl. トノ互ニヨク近似セル二屬ヲ採用シテ居ル、前者ニハブラジル產ノ Leptodendriscum delicatulum Wainio. 後者ニハ Leptogidium dendriscum Nyl. (=L. Moorei Hepp.) ヲ含〃何レモ monotypic デアル、此兩者ノ記載ヲ讀ムト殆ド一致シテ居ルガ Leptodendriscum ノ方ハ胞子ガ二室デ Leptogidium ノ方ハ一室デアルノガ差違デアル、然ルニエングラー・プラントル第二版第八卷地衣篇デハ Zahlbruckner ハ此兩屬ヲ合併シテ Leptogidium ノ一トシ且從來ノ各種ハ皆



けくづごけ
(Leptogidium byssoides var. japonicum A. Zahlbr.)
子器着生外形模型（原圖）



けくづごけ
(Leptogidium byssoides var. japonicum A. Zahlbr.)
絲狀體、子嚢、胞子
（擴大）（原圖）



けくづごけ
(Leptogidium byssoides var. japonicum A. Zahlbr.)
子器縱斷　外殼ノ一部ト子嚢層ノ一部ト子嚢ノ一部ヲ示ス
（擴大）（原圖）

之ヲ Leptogidium byssoides (Carr.) A. Zahlbr. 一ツデアルトシテ居ル、從テ我邦ノ產ヲ入レテ一屬一種一變種ト云フコトニナル、コヽデ一寸說明ヲ要スルコトハ Wainio ガ二室ノ胞子トシタモノヲ單胞ノモノニ引クルメルノハ亂暴ノ樣デアルガ吾國產ノモノデ小生モ經驗シテ居ルガ此ノ胞子ハ「プロトプラズマ」ガ粘稠デアル爲カ往々二室ニ見エルノデ甚ダ判斷ニ迷フノデ更ニ甚シキモノハ三室ニ見エルモノモアルガヨク見ルト色素ヤ試藥ニ對スル反應カラモ分ル通リ擬隔膜ニ過ギナイデ單胞トスルノガ正シイ、序ニ申スガエングラー・プラントル第二版第八卷第一五二頁ノ Leptogidium 屬特徵ノ記載ニ Sporen ... zweizellig トアルハ誤植デ同書第一四九頁ノ Ephebeaceae 屬ノ檢索表ノ最終行ニ Sporen einzellig.... Leptogidium. Sporen zweizellig .... Polychidium. ト對比シテアルノヲ見テモ分カル

○日本ノ變形菌譜　其二

理學博士　服部廣太郎

○Stemonitis herbatica Peck.